

Les infections transmissibles sexuellement

Le Nunavut en statistiques, de 2011 à 2023

- La santé sexuelle représente une grande partie de la santé et du bien-être global.
- Au Nunavut, les ITS les plus souvent rapportées sont la syphilis, la chlamydia et la gonorrhée.
- C'est pourquoi il est important de s'informer sur les infections transmissibles sexuellement (ITS), c'est-à-dire par contact sexuel de personne à personne.
- Ces trois infections peuvent être transmises par la personne porteuse même si elle ne présente aucun symptôme.
- Les ITS sont évitables et traitables. Non traitées, elles peuvent causer de graves problèmes de santé.
- Heureusement, il est possible pour la femme enceinte de passer un dépistage prénatal, ce qui augmente les chances de détection précoce de ces trois infections chez le bébé à naître.

La syphilis

Symptômes possibles :


- Plaies dans la bouche ou sur les parties génitales, non accompagnées de douleurs.
- Irritation de la peau.

Une femme enceinte qui présente la syphilis peut la transmettre à l'enfant qu'elle porte.

Taux¹ et nombre de cas de syphilis au Nunavut, de 2011 à 2023



Taux bruts par 1000 personnes en 2023, par âge et sexe



L'année 2023 en quelques chiffres :

- En 2023, on comptait 3 nouvelles infections pour 1000 personnes¹.
- Les 30 à 39 ans présentaient le plus haut taux d'infection chez la population nunavoise, et les 20 à 24 ans étaient au deuxième rang.
- Environ 51 % des nouvelles infections touchaient des femmes.

¹ Standardisé selon l'âge en fonction de la population canadienne de 2011




La chlamydia

Symptômes possibles :


- Écoulement inhabituel des organes génitaux
- Sensation de brûlure lors de l'évacuation d'urine
- Douleur pendant l'activité sexuelle

Dans la majorité des cas, l'infection ne s'accompagne d'aucun symptôme.

Taux¹ et nombre de cas de chlamydia au Nunavut, de 2011 à 2023



Taux bruts par 1000 personnes en 2023, par âge et sexe



L'année 2023 en quelques chiffres :

- ➔ La chlamydia est l'ITS qu'on rapporte le plus souvent.
- ➔ En 2023, on comptait 34 nouvelles infections pour 1000 personnes¹.
- ➔ Les 20 à 24 ans présentaient le plus haut taux d'infection chez la population nunavoise, et les 15 à 24 ans étaient au deuxième rang.
- ➔ On a rapporté deux fois plus d'infections chez les femmes que chez les hommes.
- ➔ Une infection non traitée est plus susceptible d'entraîner des complications chez la femme que chez l'homme.

La gonorrhée


- Les symptômes de la gonorrhée sont similaires à ceux de la chlamydia, mais généralement plus accentués et tenaces.

Dans la majorité des cas, l'infection ne s'accompagne d'aucun symptôme.

Taux¹ et nombre de cas de gonorrhée au Nunavut, de 2011 à 2023



Taux bruts par 1000 personnes en 2023, par âge et sexe



L'année 2023 en quelques chiffres :

- ➔ La gonorrhée est au deuxième rang des ITS les plus souvent rapportées.
- ➔ En 2023, on comptait 16 nouvelles infections pour 1000 personnes¹.
- ➔ Les 20 à 24 ans présentaient le plus haut taux d'infection chez la population nunavoise, et les 15 à 24 ans étaient au deuxième rang.
- ➔ Environ 60 % des nouvelles infections touchaient des femmes.



Les ITS au Canada, en bref

- Les cas de syphilis, de chlamydia et de gonorrhée sont en hausse dans l'ensemble du Canada.
- L'ISTS qu'on rapporte le plus, à l'échelle nationale, est la chlamydia.
- Par ailleurs, la résistance de la gonorrhée aux antimicrobiens suscite une grande préoccupation pour la santé publique.
- L'augmentation des cas de syphilis chez les femmes enceintes a entraîné une hausse du nombre de bébés qui naissent avec la syphilis.



Je me respecte



- Je me protège et je protège les autres; mais par dessus tout, je me respecte, et je respecte mon corps.
- J'utilise un condom lors d'une relation anale, orale ou vaginale pour réduire le risque de contracter ou de propager une ITS.
- Je passe à mon centre de santé pour un dépistage gratuit si :
 - je présente des symptômes d'ITS;
 - je pense que j'ai eu une relation sexuelle sans protection, ou à un moment où j'étais sous l'influence de la drogue ou de l'alcool;
 - j'entreprends une nouvelle relation, ou je ne connais pas l'historique sexuel de ma ou mon partenaire.

- Je passe un dépistage périodique, aux 3 à 6 mois, si moi ou la personne que je fréquente avons plus d'un partenaire sexuel.

Pour d'autres renseignements

Consultez le site www.irespectmyself.ca/fr, discutez avec votre intervenante ou intervenant en santé communautaire, ou rendez-vous à votre centre de santé local ou de santé publique.